

Female youth health promotion model in primary health care: a community-based study in rural Upper Egypt

A. El Nouman,¹ D. El Derwi,¹ R. Abdel Hai¹ and H. Abou Zeina¹

نموذج تعزيز صحة الفتيات في الرعاية الصحية الأولية: دراسة مجتمعية في أرياف صعيد مصر
عز العenan، دعاء الدروي، رحاب عبد الحي، هناء أبو زينة

الخلاصة: تعد الأوضاع الصحية للفتيات المهمومات إحدى الشواغل العالمية. وقد أجرت الباحثات هذه الدراسة في صعيد مصر بأسلوب متكامل لإعداد نموذج خدمات تعزيز الرعاية الصحية الأولية للفتيات. وقد تعرفت الباحثات على المشكلات الصحية لعينة تتألف من 671 شابة، تتراوح أعمارهن بين 12 – 20 عاماً، ويتمنين إلى قرية واحدة، واستخدمت الباحثات لذلك مسحًا ميدانياً للسكان، مع مناقشات للمجموعات البدوية. وتضمنت التدخلات دورات تدريبية للفائمين على إيتاء الرعاية الصحية حول المواضيع الصحية ذات الصلة، وحول مهارات التفاعل بين الزبون ومقدم الخدمة، واستئناف المجتمع والسلطة المحلية، وخصوصاً من التغليف الصحي، إلى جانب نظام تسجيل خاص للنساء. وقد لاحظت الباحثات ازدياداً في استخدام الفتيات لخدمات الرعاية الأولية.

ABSTRACT The health status of underprivileged young females is a global concern. This intervention study in rural Upper Egypt used an integrated approach to develop a model for primary care health promotion services to female adolescents. An initial household survey and focus group discussions identified the health problems of a sample of 671 adolescent women aged 12–20 years recruited from one village. Interventions included training courses for health care providers on relevant health topics and on client-provider interaction skills; community and local authority mobilization; and health education sessions and a special record system for the women. An increase was seen in the utilization of primary care services.

Modèle de promotion de la santé des jeunes filles au niveau des soins de santé primaires : étude communautaire dans les zones rurales de Haute-Égypte

RÉSUMÉ L'état de santé des jeunes femmes défavorisées est une question d'intérêt mondial. Cette étude d'intervention réalisée dans les zones rurales de Haute-Égypte a utilisé une approche intégrée pour élaborer un modèle de services de promotion des soins de santé primaires pour les adolescentes. Une enquête initiale auprès des ménages et des groupes de discussion ont permis de recenser les problèmes de santé d'un échantillon de 671 adolescentes âgées de 12 à 20 ans et sélectionnées dans un village. Les interventions comprenaient des formations destinées aux prestataires de soins et portant sur des thèmes de santé pertinents et sur les compétences en matière de rapports entre patients et prestataires ; la mobilisation de la population et des autorités locales ; des séances d'éducation sanitaire et un système d'enregistrement spécial pour les femmes. On a observé un accroissement de l'utilisation des services de soins primaires par ces jeunes femmes.

¹Department of Public Health and Community Medicine, Faculty of Medicine, University of Cairo, Cairo, Egypt (Correspondence to R. Abdel Hai: rehababdelhai@yahoo.com).

Received: 17/06/07; accepted: 20/08/07